

Nützliches zu Paxlovid

Quick and clean

Dr. med. Patricia Klein, MBA
Ärztliche Geschäftsführerin

24.08.2022

PAXLOVID FÜR WEN

So früh wie möglich nach Symptombeginn (höchstens 5 Tage!) bei positivem Schnelltest für Patienten mit Risiko auf schweren Verlauf (egal ob geimpft oder ungeimpft):

- » **PCR-Test veranlassen**
- » Prüfung Begleitmedikation (siehe im Weiteren)
- » Aufklärung Patient (siehe im Weiteren)
- » Packung mitgeben

Bei aufgetretenen unerwünschten Ereignissen, einschließlich mangelnder Wirksamkeit (basierend auf einer Verschlechterung der Symptome, einem Arztkontakt oder einer Krankenhauseinweisung aufgrund von SARS-CoV-2), umgehend Info ans BfArM:

https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Pharmakovigilanz/Risiken-melden/_node.html

DIREKTABGABE PAXLOVID

- » Bestellung über die normale Apotheke (Sprechstundenbedarf)
 - » nur für Hausärzte und Krankenhausnotaufnahmen möglich
 - » Über Muster 16 ohne Namensnennung
 - » Kostenträger Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) mit dem IK 103609999
 - » Bis zu fünf Packungen können bevorratet werden
 - » Abgabe wird mit 15 € honoriert (Pseudoziffer 88125, gültig erstmal nur bis Ende September)
-

PAXLOVID

Cave: Auch vollstationäre Pflegeeinrichtungen können Paxlovid® aus Apotheken beziehen und vorrätig halten, brauchen aber zur Abgabe eine ärztliche Verordnung.

Die Praxis darf dann natürlich nicht die 88125 abrechnen, denn es wird für Bevorratung und Abgabe gezahlt, was in diesen Fällen formal das Heim übernimmt.

PAXLOVIDEINNAHME I

- » hochpotente Inhibition von Cytochrom P450, insbesondere CYP3A4, und von P-Glykoprotein
- » Durch den gleichzeitigen Einsatz können die Plasmaspiegel zahlreicher Arzneimittel verändert werden, was zu signifikanten Arzneimitteltoxizitäten oder relevanter Wirksamkeitsminderung führen kann.
- » Die Inhibition von CYP3A4 setzt direkt ab dem Beginn der Therapie ein und ist bis **zu einer Woche** nach dem Ende der Einnahme von Paxlovid relevant.

PAXLOVIDEINNAHME II

- » Aus diesen Gründen ist es essentiell, vor dem Einsatz von Paxlovid die aktuelle Komedikation als auch Drogen- und Genussmittelkonsum (**cave Orangen- und vor allem Grapefruit-Säfte!**) genau zu erfragen und auf mögliche Wechselwirkungen mit Ritonavir ausführlich zu prüfen.
- » Bei Arzneimitteln, bei denen der gleichzeitige Einsatz von Paxlovid kontraindiziert ist und die nicht pausiert werden dürfen (z.B. Antiarrhythmika oder Medikamente zur Behandlung pulmonaler arterieller Hypertonie), muss eine alternative COVID-19-Therapie erwogen werden.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/COVRIIN_Dok/Arzneimittelwechselwirkungen_Paxlovid.pdf?__blob=publicationFile

PAXLOVIDEINNAHME III

» Lesen Sie erst die Patienteninfo selbst!

(8 Seiten, davon 6 mit relevantem Text und davon 1 Seite Kontraindikationen und 1 Seite Wechselwirkungen...)

» Prüfung der Kontraindikationen und der Wechselwirkungen (Vorbereitung durch MFA, aber unbedingt den Patienten auch nach Medikation fragen, die er ggf. von anderen Ärzten bekommt...)

» Geben Sie dann die Patienteninfo dem Patienten (ist Pflicht!) und klären ihn auf.

(Ganz nebenbei: drei Tabletten morgens und drei Tabletten abends sind nicht NUR schön...)

KONTRAINDIKATION

- » Dialysepatienten und Patienten mit eGFR < 30
- » Schwerer Leberinsuffizienz

Vorsicht bei:

- » Transplantierten unter Ciclosporin, Tacrolimus oder Everolimus (erhöhte Spiegel!!!), hier besser **RDV- oder** AK-Therapie
- » Patienten unter HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren, am besten **pausieren**
- » Patienten unter Alfuzosin (Prostata), Colchicin, Ergotamin, Cisaprid, Johanniskraut, Avanafil und Vardenafil bei erektiler Dysfunktion (fragen!!!!), Benzodiazepine (fragen!), bestimmte Antibiotika, Antimykotika, Antidepressiva, usw.)
- » für die Zeit der Einnahme bis 7 Tage danach sollte z.B. mit Kondomen verhütet werden!

PAXLOVIDEINNAHME VI

Immer prüfen, wofür das Risiko größer ist: Pausieren oder Wechselwirkungen...

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/COVRIIN_Dok/Arzneimittelwechselwirkungen_Paxlovid.pdf?__blob=publicationFile